

Sur les Spasmes Sympathiques

Des Protaphites des muscles du Larynx Pharynx &c.

J'^{remarque} avoir avec un étonnement toujours nouveau la Sympathie dont les effets avaient conduit au tombeau les malades qui font le Sujet de la III^{me} IV^{me} & VII^{me} des Observations Suivantes. N'y réfléchissant encore qu'assez superficiellement je m'accoutumais en quelque sorte à la regarder comme le produit d'une Cause qui ne serait peut-être jamais assez connue pour qu'on espérât de démentrer un jour le Mécanisme de son Action. Enfin je n'ai médité assez sérieusement sur ce terrible Phénomène lorsqu'on m'a écrit de Suède de la présente année (1762.) la femme dont il est question dans la VI^{me} Observation étant morte, je me sentis ardemment porté à chercher & à rassembler quelques lumières sur ce Sujet. C'était la quatrième tragédie de cette espèce dont j'étais témoin, et si grande que je pense que des Sept Observations que je présente à l'Académie, il n'y en a pas une dont le Sujet n'ait succombé; je plains les hommes, les uns d'être exposés à des maladies qui éludent toutes les ressources de l'Art, les autres d'avoir des connaissances trop bornées pour guerir des maux aussi terribles. Les ténèbres dont la nature s'enveloppe partout, & qui sont plus impénétrables en cette matière qu'en toute autre font que je ne crois pas que jus qu'à présent on puisse ~~avec~~ mériter d'entreprendre de donner des démonstrations non pas seulement du Mécanisme, mais même de la cause occasionnelle de la Sympathie dans les Cas dont je vais parler. ~~Encourager~~ pour encourager à cette découverte il ne faut que se représenter qu'elle mènerait ou à la connaissance du remède, ou à la certitude qu'il



n'y en a aucun. Mais ce qui n'est pas possible aujourd'hui n'est souvent rien moins qu'impossible pour l'avenir. Si ceux qui nous ont précédé nous avaient laissé l'histoire de tous les cas semblables qu'ils ont été à portée de voir, nous aurions nous mêmes l'avantage que nous faisons à ceux qui nous suivront, & après sur une certaine quantité de faits, comparant entre elles les diverses circonstances de chacun, les Symptômes, les remèdes, les succès, nous pourrions peut-être aujourd'hui offrir des conjectures vraisemblables sur l'Étiologie de cette obscure maladie, ainsi que sur les moyens curatifs. Pour éviter le reproche qu'on que je fais ici aux auteurs & aux Praticiens qui nous ont devancé, mon dessein est de faire part à l'Académie de ce que j'ai vu & de ce que j'ai trouvé dans les papiers d'un de ses Associés. Ignore si de son vivant M. Alary ne les lui a pas communiqués, & dans le doute, les faits sont si rares sur ce sujet que je me suis cru obligé de rapporter ceux de ce Chirurgien habile en même temps que les miens. C'est le moyen de ~~mieux~~ fixer l'attention des Artistes sur cette importante matière que de publier tout ce qu'on peut rassembler qui la concerne. Avant tout je vais rappeler en peu de mots ce que c'est que la Sympathie, de quel genre et de quelle espèce est celle dont je vais donner des exemples, ensuite je rapporterai sept Observations dont la première, la seconde et la cinquième sont telles que je les ai trouvées écrites de la main de M. Alary: j'ai été témoin des quatre autres, d'une des quelles (la III^e) la malade fut traitée par le même Chirurgien.

On a donné le nom de Sympathiques aux mouvements qui se font dans une partie qui n'est pas immédiatement affectée par la Cause qui les produit (il n'est point ici question de cette Sympathie qui a lieu entre un individu et un ou plusieurs autres) On peut distinguer les mouvements Sympathiques en naturels, non naturels, & contre nature. Sans nous

arrêter à ceux des deux premières espèces nous définirons le spasme sympathique contre nature, une contraction involontaire des muscles plus ou moins éloignés de la partie où en gît la cause, et qui, toujours au moins inutile, souvent dangereuse, est quelquefois mortelle de toute nécessité. Après les remèdes faits à plusieurs des malades dont j'étais parvenu, il est probable par l'événement que les spasmes sympathiques dont plusieurs muscles furent affectés étaient de cette dernière espèce.

Première Observation

(*) Le 15. Novembre 1738. au soir, un homme âgé d'environ 60 ans travaillant à un deuxième étage, il lui tomba sur la tête une Echelle de l'étage d'en dessous. Le Coup l'étonna, et il tomba du deuxième par terre & se fit une fracture des deux Os de la jambe droite à la partie moyenne supérieure. Il est vraisemblable que le Cerveau ne fut aucunement lésé. Au moins le malade n'éprouvait-il aucun des Symptômes qui l'annoncent. Il n'eut ni perte de ~~langue~~ connaissance, ni saignement soit du nez soit des Oreilles, ni vomissement, ni même contusion aux ligaments de la Tête.

La fracture du tibia était oblique, et le bord tranchant de la pièce supérieure avait fait aux ligaments une plaie par laquelle elle sortait au moins de la longueur d'un pouce. La pièce inférieure remontait entre les deux Os, & son principal déplacement était en longueur.

On réduisit cette fracture & malgré les peines qu'on a à la contenir réduites toutes celles de cette espèce cependant on la contient en bonne situation. Le malade fut saigné cinq fois dans les trois premiers jours & on arrêta la jambe avec une fomentation résolutive. Il n'eut aucun accident, la fracture la plaie & les environs étaient en bon état pendant à peu près les trois premières semaines.

Vers le 18^{ème} jour après l'accident il avait la langue chargée, point de fièvre cependant ni de douleur, quoique sans appétit malgré la diète sévère.



qu'on luy avait fait observer. Le 19. on luy fit prendre deux Oues de Manne & un grain d'Émélique. Cette Médecine le purgea fort bien haut et bas.

Tout à coup la nuit du 19. au 20. il fut pris d'un délire extraordinaire, defit tout son appareil et derangea les Os. Le matin la jambe était en fort mauvais état. La plaie était livide & les environs enflammés. Il fut saigné deux fois dans la journée qu'il passa assez tranquillement. Il avait le pouls dur & élevé, & la respiration un peu moins libre qu'à l'ordinaire.

Le 21. il prit une potion avec la Theriaque ~~trois~~^{trois} grains en trois prises qui opera beaucoup. A la levée de l'appareil la plaie était noire & en pourriture. Les grumeaux de sang qui étaient restés dans la plaie après l'hémorragie qu'avait causé le dérangement de la veille commençaient déjà à entrer en fonte putride. Les Os étaient découverts, cependant les environs de la plaie n'étaient plus enflammés ni tendus.

Le 22. il fut assez tranquille quoiqu'il eût toujours un peu de fièvre.

Le 23. Il fut purgé avec la Manne & un grain. Les Os n'avaient aucune solidité & au moindre mouvement qu'on faisait faire au pied on les entendait crepiter. Les Chairs sphacelées s'émattaient en suppuration très fétide. Pour préserver la Masse entière du sang de la dissolution putride que le repoussement ou même les seules exhalaisons de cette matière infecte pouvait y occasionner, on faisait prendre au malade deux fois par jour un demi gros de Theriaque & on continua. Le bout supérieur du Tibia s'enfonçait & l'inférieur se relevait, mais ils se remplaçaient facilement dans la situation naturelle qu'il n'était besoin pour cela que d'appuyer légèrement sur ces mêmes bouts. *P*

Le 24. Il fut purgé comme auparavant avec la manne et un grain. Il rendit beaucoup de matières noires & d'une consistance de lie de vin, qui vers la fin devinrent plus séreuses ~~mais~~^{et} plus fétides.

Si l'on eût aperçu quelques fuscées ou autres progrès de la pourriture

dans les environs de la plaie on aurait fait des incisions, & même au Sérioite, mais tous les lieux voisins paraissaient en aussi bon état que le pouvait comporter celui de la plaie.

Le 26. la suppuration commençait à être plus loüable, moins fétide, mais n'ayant cependant encore aucune liaison. A mesure que le Tissue Cellulaire des interstices des Muscles se dégorgeait ou se fondait, les Os dénués de tout soutien crépitaient & se déplaçaient d'eux mêmes.

La nuit 26. au 27. il eut un accès de délire semblable au premier avec cette circonstance de plus, qu'il grinçait les dents d'une manière effroyable. Il arracha tout son appareil. La fièvre se ralluma de nouveau. Vers les 6. heures du matin il ne grinçait plus les dents mais la mâchoire inférieure demeura invariablement fixée et entrouverte de sorte que les dents d'en bas étaient à peu près à trois lignes des dents d'en haut, sans qu'il fût possible de les faire approcher ou écarter davantage. On voulut lui faire prendre du bouillon; il pensa s'étouffer dès les premières gouttes, & chaque qu'on en laissait aller dans sa gorge au moyen d'un biberon qu'on engageait entre les dents on l'exposait au même danger. La raison & la parole (quoique beaucoup gênée) lui étaient revenues depuis que le Serrinement de dents avait cessé. Il disait ne sentir aucune douleur au Col ou la Mâchoire ni aux Tempes quoique les Muscles de toutes ces parties fussent dans le plus violent état de contraction. La jambe fracturée ne lui faisait non plus qu'une gêne de mal; il se plaignait seulement d'une légère douleur avec engourdissement dans le talon et à la plante du pied de cette jambe. Il fut saigné du pied, on essaya de lui faire avaler quelques cuillerées d'une potion Antispasmodique, mais la toux obligea de renoncer à ces tentatives qui furent toutes infructueuses.

Dans la nuit du 28 au 29. son pouls s'affaissa notablement sans que le spasme diminuât dans les parties qui en étaient affectées: au contraire



il s'étendit aux Muscles des paupières & des yeux, et les uns et les autres restèrent immobiles. Il perdit la parole; l'oppression augmenta. Sur les dix heures du matin ces parties paraissaient revenues à leur état naturel, mais il ne pouvait plus parler, ne respirait que très difficilement & paraissant n'entendre rien. La plaie cependant semblait être dans le meilleur état, à l'exception seulement de la Suppuration qui était toujours fœreuse & de mauvaise odeur. Les bras la bonne jambe ainsi que la jambe fracturée, les mains les pieds & tout le tronc étaient à tous égards dans l'état ordinaire. Aucun mouvement aucune raideur convulsive.

L'étouffement & l'impossibilité de rien avaler persistèrent jusqu'au 31.^{me} jour, à compter de celui de la fracture, & il mourut.

On l'ouvrit. On commença par la tête dans laquelle tout parut conforme à l'état naturel & quelque attention qu'on y fît on ne découvrit aucune singularité. Dans la poitrine on trouva un peu d'eau de chaque côté; les Souffles enorgés et d'un rouge livide. L'oreille gauche & le ventricule du même côté étaient remplis de sang coagulé & quelques unes de ces concrétions Lymphatiques qu'on appelle assez improprement des Stygies. Dans l'Abdomen on trouva les intestins boursoufflés mais au reste tous les Visces en bon état. On voulut dissequer la jambe fracturée moins dans l'espérance d'y découvrir la Cause du Spasme que pour savoir en quel état étaient les Os, les Muscles, les Ligaments interosseux &c. Dans les mouvements qu'on était obligé de faire faire à cette jambe pour cet effet on s'aperçut qu'il sortait par la plaie une matière ichoreuse très fétide plus abondante qu'on ne devait l'attendre de l'étendue qu'on lui découvrait. On examina de près; on vit que cette Matière s'échappait d'entre les extrémités des Os fracturés. On introduisit une sonde qui portée du côté du ~~bas~~ talon entra toute entière sans trouver la moindre résistance. On retourna la jambe & on fit une incision longitudinale à côté du tendon d'Achille

On la prolongea jusqu'au talon. On découvrit par ce moyen un sinus d'une vaste longueur qui depuis la fracture, aiant pour planches la face antérieure du Tendon allait gagner son attache au Calcaneum, auquel lieu se trouvait un petit détroit sur le bord interne de cet Os, par le moyen du quel ce sinus communiquait avec un autre assez considerable situé sous la voûte que forme l'Os Saphoide & dont le pus baignait les tendons fléchisseurs des Orteils & l'Aponévrose Plantaire.

Seconde Observation

Vers le milieu du Mois de Septembre 1741. un jeune homme âgé d'environ 22. ans eut le pied pris sous un muet qui s'écroura. Le Calcaneum se trouva dépeillé & qui faisait une plaie à lambeau très contuse. Il y survint un gonflement & une inflammation considérables qui ne cedant à aucun remède se terminèrent par plusieurs abcès qui fusèrent au loing de côté & d'autre. Ils furent ouverts & detergés. Toutes les plaies se trouverent peu à peu en bonne & loisible Suppuration, les chairs belles, lors que le 18.^{me} jour depuis la blessure il fut tout à coup saisi d'un spasme tonique de tous les Muscles tant de la Machoire inferieure que du Larynx & Pharynx & de l'Os hyoide; en sorte qu'il ne pouvait ouvrir la bouche, il avalait avec grande peine et ne pouvait que bien difficilement faire entendre ce qu'il voulait dire. Comme le spasme était tonique il n'y avait pas plus de possibilité à un mouvement qu'à un autre, par conséquent point de mouvements convulsifs. Aucun gonflement au Larynx, aux Parotides ni aux environs. Malgré les Saignées tant du bras que du pied répétées selon le besoin, les embrocations relâchantes, les Lotions Antispasmodiques, & en un mot tous les remèdes appropriés à cet état, il mourut il mourut le quatrième jour de cette attaque, toujours dans le même état, n'ayant eü de fièvre que depuis le second jour & sans avoir un seul instant de relache dans l'état violent de ses Muscles.



Troisième Observation

Une fille courant nuds pieds la nuit rencontra des morceaux de bouteille & se fit à la plante du pied droit, plus près du talon que des Orteils, une plaie transversale d'environ un pouce de profondeur qui coupait toutes les graisses formes qui recouvrent les flexisseurs des Orteils & l'aponévrose plantaire, & même le corps des tendons était entamé comme on le vit par la suite. Cette plaie était aussi longue que toute la largeur de la plante du pied.

Il y avait environ dix heures que cet accident était arrivé quand M. Alary la vit pour la première fois. Elle souffrait de grandes douleurs dans sa plaie, qui avait été pansée avec une compresse trempée dans l'eau Vulnéraire, par les gens chez qui elle était. Quelque petit fragment de verre pouvait occasionner ces douleurs; on pouvait aussi les attribuer à la lésion des tendons ou de quelques filets aponevrotiques. M. Alary examina avec beaucoup d'attention s'il y avait en effet quelque petite particule de verre, ou autre corps étranger dans cette plaie, mais il n'y découvrit rien. Elle fut pansée avec l'eau de vie affaiblie d'un quart d'eau commune; & on assujétit le pied dans la plus grande extension au moyen d'un bandage convenable dans la vue de favoriser la réunion si elle pouvait avoir lieu, ~~pour~~ & pour éviter le tiraillement et la dissection mutuelle des fibres tendineuses divisées. Cette fille âgée d'environ vingt ans, était d'une constitution sanguine, & robuste; & s'était toujours bien portée. On lui fit une grande saignée qui fut répétée le soir parce que la douleur ne diminuait point. Les lèvres de la plaie étaient boursoufflées comme il arrive ordinairement ~~à l'issue~~ dans tous les endroits dont le cuir est épais et recouvre beaucoup de graisses; outre cela les environs étaient rouges tendus & douloureux. Surtout un petit plumasson dont on couvrait la plaie on mit un cataplasme auodin qui couvrait tout le pied. Malgré cela et six fortes saignées on ne put

empêcher que cette inflammation se terminast par suppuration, ce qui emporta toutes ces épaisses boursoufflées. Pendant les quinze premiers jours qui suivirent le détachement de ce qui devait sortir, tout fut dans le meilleur état. Toutes les cellules épaissies emportées par flocons purulents laissaient un vuide capable de contenir une noix, au fond du quel on voyait les tendons fléchisseurs et la plaie qu'ils en avaient faite. Environ le 19^{ou} 20^{ou} jour au matin la plaie était aussi belle qu'à l'ordinaire, la Malade fut prise d'une difficulté considérable de respirer. Elle ne pouvait parler qu'avec peine. Elle disait sentir où elle mettait la main, (& alors elle touchait le Larinx) le même effet que si on lui eust serré cette partie avec une corde. L'air entrant & sortait non pas avec râlement comme dans le Catarre suffoquant, mais avec un sifflement aigu. Elle fut saignée dix fois tant du bras, ~~de~~ que du pied & de la gorge. Elle fut purgée, baignée, prit des lavements, fit usage d'Antispasmodiques sous toutes les formes connues (elle avait le pouvoir d'avaler): malgré tout elle mourut le 25 ou le 26^{ou} jour depuis son premier accident, après en avoir été sept jours dans cet état d'étranglement qui ne devint absolu et total que par degrés. Elle n'eut de fièvre que les deux derniers jours, & ne ressentit pas la moindre douleur dans aucune partie du Corps, pas même dans la jambe ni le pied malade. Elle ne fut point ouverte.

Quatrième Observation

Avant eu dessein de naviguer en qualité de Chirurgien de Vaisseau, je m'étais rendu à Nantes dès les premiers jours de 1753. & pendant le séjour que j'y fis, ainsi qu'à Limbourg, jusqu'au mois de Septembre suivant que je revins dans ma patrie sans m'être embarqué; j'eus occasion de voir plusieurs malades, & entre autre un jeune pàssan des environs dont je vais rapporter l'histoire.

En jouant une partie de longue-paume, il reçut sur le milieu



de la partie inférieure interne de l'avant-bras gauche une balle lancée avec un battoir par un vigoureux paysan plexe à 20 ou 30 pas de lui. L'engourdissement fut si grand qu'il ne sentit pas la moindre douleur. Il ne pouvait plus remuer les doigts ni la main & ne faisait qu'avec peine quelques mouvements de l'avant-bras & du bras. Je lui trouvai une fracture à la partie inférieure du Radius, & un Diastasis du bout inférieur du Cubitus, lequel n'était point fracture. Je m'étais trouvé auprès du malade presque aussitôt après l'accident & si je ne l'eusse vu que quelques moments plus tard, je n'aurais certainement rien pu distinguer de l'état des choses tant le gonflement & la tension furent rapides & considérables. Je me hâtai de réduire autant qu'il fut possible le Diastasis, & je donnai une direction convenable à la main et au poignet qui, par la contraction irrégulière des Muscles en prenaient une fort mauvaise. Au moyen d'une palette faite d'un bois léger et dont une extrémité fort allongée et large d'environ trois pouces servait d'Atelle à la partie interne de l'avant-bras j'essayai de contenir les parties dans la situation naturelle. Avant de poser la main sur cette Palette j'avais fait quelques tours de bande seulement pour contenir une compresse trempée dans le vin, que j'avais mis autour de la partie malade. Cet appareil ne servit guères à remplir l'indication que je me proposais, car le Radius étant brisé en plusieurs pièces qui ne se prelaient pas mutuellement un point d'appui assez solide pour résister à la contraction des Muscles qui était considérable. D'un autre côté le gonflement des environs ne me permettait pas de suppléer à cette solidité par un bandage serré. De sorte que malgré tout ce que je pus faire la main ni le poignet ne restèrent pas droits comme ils l'auraient dû. Je le saignai après qu'il fut posé, je réitérai dans la nuit & le lendemain matin je le saignai une troisième fois. La main & l'avant-bras étaient fort gonflés & très douloureux. J'arrachai le tout

avec deux tiers d'eau & un tiers d'eau de vie. Le troisième jour, ~~il fut~~ il se
~~lui~~ plaignait d'élançements fréquents dans le poignet & dans le creux
 de la main : tout était gonflé au dernier point malgré six saignées qui avaient
 déjà été faites. Il fut saigné pour la septième fois. Je couvris toute la main
 & une partie de l'avant bras d'un Cataplasme. Quodiam. Il avait la langue
 chargée, avec un filon jaunâtre au milieu et il se sentait des nausées.
 Je lui fis prendre trois grains d'Émélique en trois gobelets d'eau froide : ce qui
 l'invacua beaucoup haut et bas. Je continuai les pansements, comme à l'ordinaire
 jusqu'au septième jour qu'à travers les chairs gonflées et noires du poignet
 je crus sentir une fluctuation, enfoncée, à la vérité et bien dure encore. Je
 remis au lendemain à décider ce qu'il fallait faire. Le huitième jour, donc
 trouvant que le fluide rassemblé pénétrait mieux que la veille, je fis une
 incision longitudinale à la partie inférieure interne de l'avant bras : il
 ne sortit pas une grande quantité de matière mais elle était épaisse & languissante.
 Il survint successivement deux autres dépôts à la partie externe du carpe
 & du Métacarpe. Il en vint un quatrième vers le talon de la main
 précisément entre le thenar & l'hypothenar. Toutes les parties grasses des
 environs tombèrent en suppuration. Le ligament annulaire resta isolé,
 & les tendons fléchisseurs découverts ainsi que l'aponévrose palmaire.
 Je pansai toutes ces plaies pendant un mois et elles étaient dans le meilleur
 état lors qu'en le pansant et tirant avec bien de la précaution quelques
 bourdonnets mollets que je mettais avec dans la plaie du creux de la main
 j'entendis les dents du malade frapper fortement les unes contre les autres.
 Le bruit qu'elles firent fut assez fort pour ~~m'engager~~ ^{m'engager} à regarder, je vis
 la mâchoire inférieure serrée fortement contre celle d'en haut & les Écatholites
 gonflés et extrêmement durs. Il avait la tête tendue et le Col fort
 dur et inflexible. J'achevai le pansement promptement, et je lui fis
 une ample saignée du pied. En voulant lui faire passer dans la gorge

quelques cuillerées d'eau de fleur d'Orange, au moyen d'un biberon que j'introduisais dans l'espace vuide de quelques dents qui lui manquaient, je m'aperçus que la langue était collée avec beaucoup de force à la voûte du palais. j'essayai avec une spatule de l'en détacher, mais je n'y pus réussir, quoique j'introduisisses la spatule entre la langue & le palais. Je pensai que peut-être les Muscles Basoglosses & l'hyoglosses n'agissaient pas avec autant de violence en approchant du fond de la bouche qu'au vers la pointe ou le milieu de la langue; dans cette idée j'appplatiss le bec du biberon et le glissant entre la langue et le palais du côté du Pharynx il courut en effet quelque chose, mais apparemment que le larynx & l'épiglottide étaient aussi en convulsion et que la liquueur cuita dans le Larynx, car aussitôt il lui prit une toux dont il pensa suffoquer et qui dura un peu de temps. Je renonçai à répéter cette dangereuse tentative. Je répétai la saignée du pied deux fois dans la journée; ce qui ne lui procura aucun soulagement ni dans la respiration ni dans la parole qui était abolie et remplacée par un murmure sourd et non articulé. Pendant les deux premiers jours de cet état je lui fis prendre quatre bains de deux heures chacun. Et continuai ainsi trois jours entiers sans avaler quoique ce soit. Je lui faisais prendre de quatre en quatre heures un Lave ment nutritif de bouillon & de Creme de riz. Le quatrième jour la fièvre le prit avec de grandes agitations et délire. Il ne parlait point mais il riait, & c'est d'où l'on conclut le délire, car ~~car~~ son rire n'était point cette affreuse grimace qu'on appelle fort improprement ris lardonique. Il laissa tout sous lui dans cette quatrième journée. Depuis ce dernier Symptôme son pouls s'affaissa beaucoup et s'éclipsa fréquemment; enfin il mourut la nuit de 4 au 5 vers les deux heures du matin. Il ne se fit aucun relâchement dans tous les Muscles affectés. Tournis son bras (ne pouvant gagner sur les parents de ne lui verser ouvrir le corps) Je trouvai l'extrémité inférieure du Radius

fracturée en trois pièces.

Cinquième Observation

(*) Le 2. Janvier 1744. un homme âgé de ... fut blessé par une Charrette dont la roue lui passa sur la partie inférieure. & sur l'articulation de la jambe droite. Il eut toute la partie postérieure & les parties latérales de poignées de l'os légumens. On me le fit voir le 17. du même mois. Il avait alors les parties que je viens de nommer, effectivement de poignées & les Muscles ainsi que le tendon d'Achille tous nuds: Soit que cela fut arrivé immédiatement à l'occasion, par la roue de la Charrette, soit que ce fût l'effet de la pourriture qui, me dit-on, s'était emparé de toute cette énorme blessure, et dont il y avait encore des témoins subsistants qui consistaient en plusieurs Lambeaux. à la plante du pied & aux Os, & par là formant une espèce de ~~carapace~~ de palette. sur l'Exposition de cette Sotte d'yeux. Le reste de cette plaie était alors (le 17. jour) en assez bon état, le tendon d'Achille était couvert de Chairs & de vires: aucun accident n'avait encore annoncé jusqu'au 16. le dénouement de la Charrette. Le traitement avait été conduit jusques là sans aucun obstacle de la part de la nature ni de celle du malade. Il n'y avait aucune fracture, nul déplacement dans les Os: les mouvements s'exécutoient presque sans douleur. Enfin rien ne paraissait si simple que cette Plaie, à un reste de pourriture près, qui comme je l'ai dit couvrait encore la moitié de la plante du Pied. Le malade, au reste, ne se plaignait de rien: ne ressentait point de mal, & n'éprouvait aucun dérangement dans ses fonctions.

On fut bien surpris le 17. au matin de le voir saisi d'un Spasme & d'Érthisme dans tous les Muscles, mais principalement & avec une telle violence dans ceux de la mâchoire inférieure: du Larynx & du Pharynx. qu'on ne pouvait lui ouvrir la bouche & qu'il ne respirait qu'avec grand'peine.

(*) C'est M. Alary qui parle.



tant près à suffoquer, & jettant une vive clameur comme un Épileptique. Il n'avait cependant jamais éprouvé le moindre symptôme de cette maladie. Il conservait toute sa raison. D'abord qu'on voulait lui faire avaler quelque liquide que ce fût, il était sur le point d'être étranglé & tombait dans des convulsions affreuses.

Il parlait avec beaucoup de difficulté; cependant il se faisait assez bien entendre. Les Muscles du bas-Ventre étaient durs & tendus comme des Planches. Il urinait; allait à la selle, & n'avait aucune envie de vomir. Tel était l'état où je le vis pour la première fois.

À l'aspect de ces accidents ma première attention se porta à examiner ce qui se passait dans la plaie pour voir s'il n'y avait rien de particulier à quoi on pût les attribuer. Ce qui me parut le plus étonnant c'est que les Muscles n'en n'étaient pas en contraction comme ceux de toutes les autres parties du Corps. Enfin j'eus beau examiner je ne trouvai que ce que j'ai déjà dit) les graisses de la plante du pied partie déjà emportées; partie actuellement en pourriture.

Je le fis saigner du pied et ordonnai de laisser couler le Sang usque ad deliquium. Dans la syncope, les Muscles qui depuis le moment de l'attaque étaient dans une contraction violente et continuelle se trouverent dans un état un peu différent: il y eut quelques moments de relâche alternativement dans les Pugières & dans les antagonistes, mais en dernier lieu ils restèrent au point où ils étaient avant la saignée. On en fit une semblable le soir qui lui causa une syncope de près d'un quart d'heure, pendant laquelle il eut des mouvements convulsifs comme à l'occasion de la saignée du matin, après lesquels les Muscles reprirent leur état de spasme tonique pour la troisième fois & à demeure. Le 20. au soir il eut de la fièvre et du délire & il mourut le 22. à quatre heures du matin. Il fut ouvert

On trouva les Intestins & l'Estomac remplis de vents. La Rate était plus rouge qu'elle n'a coutume de l'être dans l'état naturel. Il n'avait qu'un (c'était le gauche) dont le volume était considérable, ainsi qu'il arrive ordinairement dans ce cas. Il y avait un peu d'eau dans chaque côté de la poitrine: le Séricarde en particulier en contenait près de trois onces: le Cœur était petit & flaccide & pâle. Les Mouinses le Cerveau & le cervelet n'offraient rien de remarquable, non plus que la dissection des Muscles du Col, et d'une partie de ceux qui composent ce que Riolan appelle le Bouquet Anatomique.

Sixième Observation.

Une femme de Campagne âgée de 32. Ans, accouchée depuis 18 Mois & nourrice depuis ce temps, vint le dimanche 11 Juillet de la présente année (1762.) amener son nourrisson à Chartres chez ses parents. Sur les sept heures du soir tenant et agrippant sur son bras droit & montant sur un Onc qui devait la reporter à son Village, elle tomba en arrière sur le pavé & se fractura l'avant-bras droit à la partie inférieure. La fracture était Complète & compliquée d'une plaie longue d'environ un demi-pouce faite par la partie interne par l'extrémité tranchante & pointue du bout Supérieur du Radius. L'enfant qui heureusement n'eut point de mal fut reporté chez son père, & la nourrice à l'Hôtel-Dieu. M. Bardet Chirurgien major de cette Maison réduisit cette fracture & la pansa comme une fracture simple sans tenir grand compte de la petite plaie qui l'accompagnait, & qui en effet lorsque les os furent réduits se refermaient comme une saignée: n'y ayant ni gonflement ni douleur il inferait que vraisemblablement cette petite plaie se réunirait sans aucun accident. Cependant il s'aperçut et les aides qui tenaient la main & l'avant-bras le sentirent bien distinctement & à plusieurs reprises que cette femme faisait un mouvement qui tendait à approcher le bras des côtes & à fléchir l'avant-bras. Les uns & les autres attribuèrent avec assez de vraisemblance

les mouvements à la douleur qu'elle ~~avait~~ ressentait ou la crainte qu'elle avait eue. Aussitôt après qu'elle fut pansée on la saigna. On réitéra le lendemain matin, & en voulant redonner à son bras sa juste position dont il était un peu éloigné on remarqua encore ~~les~~ aussi distinctement que la veille les mêmes mouvements tendants à la flexion de l'avant-bras. On les attribua encore à la douleur & on continua à prendre le vraisemblable pour le vrai.

Elle ne se plaignait d'aucune douleur dans aucune partie de son corps, seulement elle avait de la peine et de la répugnance à avaler le bouillon et le risaune. Sous pareil à tout sinistre événement, quoique elle n'eût pas de fièvre, on lui fit cinq saignées. Peu à peu elle perdit l'appétit, les mouvements dont il vient d'être question devinrent plus forts & plus fréquents, & la difficulté d'avaler augmenta. Comme j'allais voir une femme à la quelle je m'intéressais (*), M. Bardet me fit voir cette femme & me fit un précis de tout ce qui avait précédé (c'était alors le dixième jour depuis la fracture) Il allait l'exposer un depuis trois jours il la pansait tous les jours une fois, à cause du dérangement que les mouvements involontaires causaient à l'appareil, et à cause aussi de la plaie qui était devenue plus importante qu'on n'avait eu lieu de le conjecturer d'abord. Je me chargeai de tenir la main pour mieux juger de la force de ces mouvements. Je remarquai que de minute en minute elle avait un trépidement dans l'avant-bras qui était en même temps entraîné à faire le mouvement de flexion. J'appris que la nuit dernière (du 9 au 10.) elle avait eu un mouvement involontaire de tout le corps, qui, à la vérité, n'avait pas

(*) La femme que j'allais voir portait au sein gauche un Cancer ulcéré, la grosseur du poing. La Masse Cancéreuse étant adhérente aux Costes, la maladie provenant d'un vice de liqueurs, et dattant de quatre ou cinq années, la femme en fin étant d'une très mauvaise santé, M. Bardet ne voulut pas risquer l'opération et m'engagea à essayer sur elle l'effet de la Bella-dona. M. Marteau Médecin fort connu, d'Amalo, avait eu la complaisance de me faire tenir une bouteille de la teinture de cette plante, telle qu'il en a publié la recette dans le journal de Médecine & tout semblable.

de la longue durée, mais qui avait été assez violent pour la faire tomber de son lit; Que depuis le matin elle éprouvait plus de difficulté et de répugnance à avaler qu'elle n'en avait encore eue; qu'elle craignait de boire & que le peu qu'elle buvait après bien des instances que les sœurs lui faisaient, elle ne pouvait pas même essayer de le boire dans un gobelet ou une écuelle, mais qu'il fallait qu'on se servît d'un biberon; que dans l'instant que la boisson passait elle ressentait une grande douleur dans la gorge. Avec tous ces symptômes elle avait le pouls fébrile & concentré. Les mouvements convulsifs dont j'étais témoin me portèrent d'abord à croire qu'il y avait quelque esquille dont la présence irritait d'une manière quelconque quelque partie membraneuse, nerveuse, tendineuse &c. Dans les environs de la fracture, & conséquemment je proposai à M. Bardet ^{d'}faire la dilatation de la petite plaie, qui, loin de se refermer laissait échapper une serosité acre, brune & un peu fétide. Il y repugna pour une fort bonne raison que je sentais aussi mais qui me semblait devoir être subordonnée au soin de sauver la vie s'il était possible: c'était le risque qu'il y avait de mettre à découvert une fracture qui n'était pas plus consolidée que la première jour. Je fis observer que ce défaut de consolidation était peut-être une raison de plus pour déterminer à l'incision, dans le cas où, comme il était probable la matière sanieuse qu'on voyait baignerait les extrémités des 2 fractures et n'aurait pas une assez libre issue. M. Bardet ne se rendit point pour lors. Mais le lendemain matin, malgré sa répugnance il se détermina à cette dilatation, & il fut alors démontré que ma conjecture était fautive car il ne se trouva point d'esquille. Les mouvements devinrent plus violents dans le reste de la journée, elle témoigna manifestement une horreur invincible pour tout liquide

à celle avec laquelle il avait guéri M^{lle} de Launay. J'ai fait prendre de cette teinture à cette femme en augmentant par degrés comme il est d'usage: elle en prit pendant trois mois au bout desquels elle est morte sans aucun soulagement & sans apparence de la plus légère diminution.

quelconque, grinçant les dents et se mettant en fureur contre ceux qui lui en-
présentaient ou seulement qui lui en parlaient. Le soir les Convulsions
de son bras blessé furent plus fortes que jamais. L'autre avant-bras fut
pris aussi, & ce qu'il y a de singulier ce fut de même les seuls flexisseurs
qui furent affectés. Dans la nuit les Ecotaphites furent pris d'un spasme
si violent, qu'il fut de toute impossibilité de lui entrouvrir les dents. La
tête s'embarrassa et il survint un furieux délire qui ne dura que jusqu'à
minuit après quoi elle perdit la parole. La respiration devint de plus
en plus laborieuse jusqu'à trois heures du matin qu'elle mourut, étranglée
probablement par le spasme des Muscles Ary-Épiglottidiens, au moins
on en peut porter ce jugement par la circonstance, qu'au lieu de râler
sa respiration n'était plus vers le moment qu'elle mourut, qu'un
sifflement tel, après que celui des Oies irritées.

L'Oubli d'un Elève fut cause que l'enterrement n'ayant pas été retardé,
nous trouvâmes, M. Bardet & moi lorsque nous allions pour faire l'ouverture
du corps, qu'il était déjà dans l'église: ainsi nous ne pûmes rien savoir de plus
positif sur les causes visibles de ces accidents extraordinaires (spasme Sympathique
& hydrophobie) & sur leur réunion en un même sujet: Observation à laquelle
peut-être jamais fracture ne donna lieu avant celle-ci.

Septième Observation.

Un Garde-de-Chasse robuste & d'une excellente constitution âgé
d'environ 32. ans avait reçu dans l'année 1752. un coup de bâton sur
le ~~tibia~~ tibia droit qui malgré les remèdes qu'on lui fit alors
bien loing de perdre du volume extraordinaire qu'il avait acquis à la
suite de cette Contusion, augmenta de plus en plus quoique sans grandes
douleurs. Enfin il parvint au point que le volume l'empêchait de
marcher. Cet homme prit alors le parti de se faire faire l'opération, &
pour cet effet il se rendit à Chartres dans le commencement d'avril 1755.

Après avoir préparé par les Remèdes Généraux M. Bardet lui fit cette opération le 17. du même Mois en commençant par faire la ponction au Testicule dont il sortit près d'un demi-septier d'une eau légèrement citronnée, l'impure & sans odeur. Le succès fut des plus heureux, le malade n'eut pas un seul accès de fièvre, point d'hémorragie; point de douleurs. Vers le 18.^e jour de son Opération, il avait la bouche pâteuse, la Langue blanche, et des nausées. On lui fit prendre deux grains d'Emétique en lavage qui sans le faire vomir plus d'une fois lui procurèrent dix à douze selles. Le 23. Il fut purgé avec la Masse & le Syrop de Summes. La pleurée étoit devenue blaffarde, les chairs mollasses et fongueuses. La nuit du 25. au 26. à quatre heures du matin, voulant prendre un bouillon il fut saisi d'un spasme dans les Protaphites qui s'envenimèrent tendus au point qu'il fut de toute impossibilité de lui ouvrir la bouche. Peu à peu cette affection gagna les Muscles du col, du tronc & des jambes, de sorte qu'aux bras près c'étoit un Tétanos universel. On lui fit tous les remèdes indiqués en pareil cas, sans qu'il en reçut le moindre soulagement. Le 27. la respiration devint fort difficile et avec sifflement. Il disoit ne sentir aucune douleur. Il eut de la fièvre et du délire le soir et dans la nuit; et il mourut vers 4 heures du matin le 28.^e jour d'après son opération. Il ne fut point ouvert.

Tous les Auteurs qui ont traité des mouvements sympathiques contre nature, ont commencé par chercher les routes visibles par lesquelles les affections sympathiques peuvent ainsi se transmettre d'une partie à l'autre. Les uns ont dit que c'étoit les nerfs, les autres que c'étoit les vaisseaux; ceux qui ont expliqué les cas les plus aisés (Mem: d'Érrib: Tom: VI.) n'ont pas eu beaucoup de peine à prouver que quelquefois c'étoit les nerfs



quelque fois les Muscles & leurs tendons : mais aucun de ces Auteurs n'a pensé à rassembler un certain nombre de faits pour y chercher en quoi ils pouvaient convenir ensemble. Comme aucune des explications données jusqu'à présent, (*) depuis celle de M. Astruc qui suppose tout jusqu'à celle de M. Crawford qui démontre tout, n'est suffisante pour rendre raison de tous les phénomènes remarqués dans les observations qu'on vient de lire : Il me semble que le parti le plus sage est de renoncer à l'explication ^{générale} du Mécanisme et à assigner les causes occasionnelles de cette maladie jusqu'à ce que des Observateurs plus heureux & des faits plus multipliés aient jeté du jour sur la Théorie des spasmes : Affection si commune & en même temps si peu connue encore ! En attendant je me contenterai de joindre sous un même point de vue les circonstances communes à toutes, ou au plus grand nombre des faits cy dessus, & les principaux événements.

Tous les Malades dont on vient de lire les histoires reconnaissent des agents externes pour causes de leurs maladies.

Tous, excepté la femme de la Sixième Observation, ont été en très bon état jusqu'au 15. ou 18.^e jour.

Tous ont péri : aucun ~~avant~~ ^{n'a atteint} le quarantième jour ; aucun excepté la femme de la Sixième Observation n'est mort avant le 18.^e

Aucun n'a eu le Spasme moins de deux jours : aucun, excepté la femme de la Sixième Observation, ne l'a eu plus de sept.

Tous, excepté le malade de la Septième Observation avaient des plaies dans lesquelles les tendons, les Ligaments ou les Aponeuroses soit Splanchnique soit Plantaire, étaient irrités de manière quelconque ou d'un moins pouvaient légitimement ~~être~~ en être soupçonnés.

Les Spasmes, au reste, étaient-ils Sympathiques aux blessures des malades, ou en étaient-ils indépendants ?

Dire qu'ils ne dépendaient point des blessures, c'est ce me semble

(*) Senus Medicorum verba in hoc Symptomate universa propria esse verbis Medicorum seu fabellis cauentium quàm demonstratorum. Cuvier oës. 5. Collectam.

Donner des bornes un peu étroites à l'énergie ou à l'irritabilité (*) du système nerveux qu'on ne connaît pas encore assez, pour se flatter sans témérité de savoir tout ce dont il est capable.

Dit-on que les blessures ont occasionné les spasmes :... pourquoi tant d'autres blessés de même et aux mêmes endroits guérissent-ils ~~sans spasme~~ ou meurent-ils sans spasme ?.... Cependant il me semble qu'il ne répugnerait pas davantage de dire que ces Malades ne sont pas morts à cause du spasme, parce que bien d'autres meurent et n'en ont point, que de dire que leurs blessures quoique en bon état et en voie de guérison prochaine n'^{ont} été pour rien dans la cause des spasmes qu'ils ont eus jusqu'à la mort.

Les Obscurités et les Difficultés sans nombre qui naissent à chaque instant de réflexion sur cette matière ne me laissent que le desir sincère d'applaudir à celui qui donnerait une explication satisfaisante à tout, et fondée sur des principes clairs et physiques, & je ne croirais pas avoir perdu mon temps si les Observations que je présente à l'Académie faisaient naître à quelqu'un de ses membres le dessein de tourner ses réflexions de ce côté de cette branche de la Pathologie Chirurgicale.

(*) Je ne me sers de ce mot que faute d'un autre, & mon dessein n'est pas de parler de la Douleur.

Philippe ^{M^{re}} en arts & en Chirurgie

à Chartres en Sauc. le 23. Decembre 1762.



James B. Jones was born in the town of ...
...

...

...

...

...

...

...

...



